



WHO Recommended Formula

WHO recommends to provide children with 20mg per day of zinc supplementation for 10-14 days (10mg per day for infants under six months old) together with ORS in the treatment of childhood diarrhoea.



The best treatment for “DIARRHOEA”

- Stops diarrhoea faster
- Ensures quicker recovery of health

Kilitch **SRO** **ZINC**

DIARRHOEA TREATMENT KIT

2 sachets of Oral Rehydration Salts (ORS)
10 Zinc Sulfate dispersible tablets



+




ORANGE FLAVOURED


2 ORS sachets + 10 tablets of 20mg Zinc



Le meilleur traitement de la
“DIARRHÉE”

- Arrête plus rapidement la diarrhée
- Assure une récupération plus rapide de la santé

Kilitch
SRO  **ZINC**



Kilitch SRO ZINC

KIT DE TRAITEMENT DE LA DIARRHÉE

BABY

(0-6 months / mois)

CHILDREN / ENFANTS

(+6 months / mois)

Si un bébé perd des selles molles ou liquides au moins 3 fois dans les 24 heures, ou plus fréquemment que d'habitude, il est probable qu'il ait la diarrhée. Donnez au bébé **Kilitch SRO ZINC** (SRO et Zinc).

Démarrez le traitement de SRO et de zinc, le même jour. Donner le SRO au bébé pendant 2 jours et le Zinc pendant 10 jours.

Versez tout le contenu d'un sachet de SRO dans 1 litre d'eau potable (il est recommandé d'utiliser de l'eau bouillie et refroidie).

Remuez jusqu'à ce que la solution de SRO soit complètement dissoute.

Donnez au bébé la préparation de SRO après chaque selle. Donnez au bébé au moins **½ litre** de préparation tout au long de la journée et **jetez le reste**.

Faire une préparation fraîche pour 2 jours.

Démarrez le traitement de Zinc le même jour que le traitement de SRO.

Mettez **½ comprimé** de Zinc dans une cuillère propre.

Versez le lait maternel ou de l'eau potable dans une cuillère contenant ½ comprimé de Zinc.

Assurez-vous que le comprimé soit complètement dissous.

Donnez au bébé tout le liquide dans la cuillère.

Continuez le traitement pendant 10 jours consécutifs, même si la diarrhée a cessé.

Si un enfant perd des selles molles ou liquides au moins 3 fois dans les 24 heures, ou plus fréquemment que d'habitude, il est probable qu'il ait la diarrhée. Donnez à l'enfant **Kilitch SRO ZINC** (SRO et Zinc).

Démarrez le traitement de SRO et de zinc, le même jour. Donner le SRO à l'enfant pendant 2 jours et le Zinc pendant 10 jours.

Versez tout le contenu d'un sachet de SRO dans 1 litre d'eau potable (il est recommandé d'utiliser de l'eau bouillie et refroidie).

Remuez jusqu'à ce que la solution de SRO soit complètement dissoute.

Donnez à l'enfant la préparation de SRO après chaque selle. Donnez à l'enfant au moins **1 litre** de préparation tout au long de la journée.

Faire une préparation fraîche pour 2 jours.

Démarrez le traitement de Zinc le même jour que le traitement de SRO.

Mettez **1 comprimé** de Zinc dans une cuillère propre.

Versez le lait maternel ou de l'eau potable dans une cuillère contenant 1 comprimé de Zinc.

Assurez-vous que le comprimé soit complètement dissous.

Donnez à l'enfant tout le liquide dans la cuillère.

Continuez le traitement pendant 10 jours consécutifs, même si la diarrhée a cessé.

24 hrs.



Utiliser la solution de SRO reconstitué dans les 24 heures. Jeter toute solution inutilisée après 24 heures.



Amener l'enfant au centre de santé si un ou plusieurs des symptômes suivants apparaissent :

- La diarrhée ne cesse pas un peu dans les 24 heures.
- Les signes de déshydratation, qui comprennent la bouche et la langue sèche, les yeux enfoncés ou les joues, et la peau qui ne s'aplatit pas lorsqu'on la pince et on relâche.
- Présence de sang dans les selles.
- Fièvre élevée.

